

OBSTRUCTION TOTALE DES VOIES AERIENNES

1

Les signes :

- La victime **ne peut plus parler, crier, tousser ou émettre aucun son** ;
- La victime **garde la bouche ouverte** ;
- La victime **s'agite, devient rapidement bleue puis perd connaissance**.

3

EN CAS D'INEFFICACITÉ :

Si la victime est un adulte ou un enfant, **réaliser des compressions au niveau abdominal** :

- Se placer **derrière** la victime, contre son dos ;
- Passer ses **bras, sous ceux de la victime**, de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen ;
- Pencher la victime en avant ;
- Mettre le poing sur la partie supérieure de l'abdomen, au creux de l'estomac, au-dessus du nombril et en dessous du sternum ;
- Placer la seconde main sur la première, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes ;
- **Tirer franchement** en exerçant une **pression vers l'arrière et vers le haut** ;
- Réaliser **1 à 5 compressions** en relâchant entre chacune.




Figure 3.3

2

Donner 5 claques dans le dos :

- Se placer sur le côté et légèrement en arrière de la victime.
- Soutenir le thorax de la victime avec une main et la pencher suffisamment en avant pour que le corps étranger dégagé sorte de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes.
- Lui donner 5 claques vigoureuses dans le dos entre les 2 omoplates.



4a

LES MANŒUVRES SONT EFFICACES :

- Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux ;
- La réconforter en lui parlant régulièrement ;
- Desserrer ses vêtements ;
- Demander un avis médical et appliquer les consignes ;
- Surveiller la victime.

4b

LES MANŒUVRES NE SONT PAS EFFICACES : LA VICTIME PERD CONNAISSANCE :

- Accompagner la victime au sol ;
- Faire alerter ou alerter les secours ;
- Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire ;
- Vérifier la présence du corps étranger dans la bouche à la fin de chaque cycle de compressions thoraciques. Le retirer prudemment s'il est accessible.

